

**Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

**Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό ΔΝ, αριθμός θανάτων\*\* (% θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό [σύνολο και με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του ΔΝ	Έτος												Σύνολο 2010-2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Σύνολο κρουσμάτων</b>	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	1.420
<b>Κρούσματα ΜΕ προσβολή ΚΝΣ (%)</b>	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	1.011 (71%)
<b>Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)</b>	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	0,9*
<b>Αριθμός (%) θανάτων</b>	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (13%)	201 (14%)
<b>Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ</b>	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (17%)	192 (19%)

\* Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2021

\*\* Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

**Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	86,2%	872
Μηνιγγίτιδα	12,4%	125
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1,4%	14
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	42*
<b>Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ</b>	<b>100%</b>	<b>1.011</b>

\* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

**Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,7	17
20-29	1,5	15
30-39	3,7	37
40-49	3,9	39
50-59	9,4	95
60-69	17,6	178
70-79	33,8	342
≥80	28,5	288
<b>Σύνολο</b>	<b>100</b>	<b>1.011</b>

**Πίνακας 4. Ποσοστά (%)\* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	93%
Σύγχυση	76%	26%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	75%	75%
Κεφαλαλγία	61%	61%
Υπνηλία	55%	30%
Ανορεξία	53%	51%
Ρίγος	49%	46%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	49%	48%
Αίσθημα ζάλης	40%	27%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	36%	47%
Τρόμος/ εξωπυραμιδικά συμπτώματα	34%	3%**
Αστάθεια	29%	3%**
Εξάνθημα	17%	32%
Κοιλιακό άλγος	16%	20%
Παρέσεις/ παραλύσεις	12%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	11%	19%
Αιμωδίες	10%	7%
Θάμβος όρασης	10%	4%
Διογκωμένοι λεμφαδένες	5%	16%

\* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών στα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

\*\* Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).